Versie: januari 2015

Bloedsuikerverlagende medicatie bij type 2 diabetes in België verkrijgbaar anno 2015

Klasse	Generische naam	Merknaam	Aandachtspunten
Glucosidaseremmers	Acarbose	Glucobay®	Te nemen vóór maaltijd Voordeel: geen hypoglycemie Nadeel: vooral gasvorming, diarree Niet terugbetaald in België
Biguaniden	Metformine	Metformine® Glucophage® Metformax®	Te nemen tijdens of na eten Voordeel: geen hypoglycemie, geen gewichtstoename Nadeel: kan misselijkheid en/of diarree veroorzaken (vooral bij opstarten), verminderde eetlust. Niet geschikt bij verminderde nierfunctie
Gliniden	Repaglinide	NovoNorm® Repaglinide®	Te nemen vóór de maaltijd Bij overslaan van een maaltijd niet innemen Voordeel: kortwerkend, weinig tot geen gewichtstoename Nadeel: hypoglycemie
Sulfonylurea	Glibenclamide	Daonil® Euglucon®	Te nemen vóór de maaltijd Lange werking. Niet geschikt bij ouderen en personen met nierinsufficiëntie Nadeel: hypoglycemie, (beperkte) gewichtstoename
	Gliquidone	Glurenorm®	Te nemen vóór de maaltijd Middellange werkingsduur Voordeel: mag gebruikt worden bij nierinsufficiëntie Nadeel: hypoglycemie, (beperkte) gewichtstoename

Klasse	Generische naam	Merknaam	Aandachtspunten
Sulfonylurea (vervolg)	Gliclazide	Uni Diamicron® Gliclazide (Retard)® Uni Gliclazide®	Te nemen vóór de maaltijd Uni Diamicron®, Uni Gliclazide® en Gliclazide Retard®: langwerkend Gliclazide®: middellang werkend Nadeel: hypoglycemie, (beperkte) gewichtstoename
	Glimepiride	Amarylle® Glimepirde®	Te nemen 's morgens Lange werkingsduur. Niet geschikt bij ouderen en personen met nierinsufficiëntie Nadeel: hypoglycemie, (beperkte) gewichtstoename
	Glipizide	Glibinese® Minidiab®	Te nemen vóór de maaltijd Korte werkingsduur Nadeel: hypoglycemie, (beperkte) gewichtstoename
Glitazones (Thiazolidinediones)	Pioglitazone	Actos®	Te nemen 's morgens Voordeel: goede tolerantie, geen hypoglycemie Nadeel: belangrijke gewichtstoename, soms vochtstapeling. Niet geschikt bij patiënten met hartfalen
DPP-4-remmers (gliptines)	Alogliptine	Vipidia®	Tablet in te nemen bij of los van de maaltijd, éénmaal daags Voordeel: geen gewichtstoename, weinig risico op hypoglycemie Nadeel: soms lichte misselijkheid
	Linagliptine	Trajenta®	Tablet in te nemen bij of los van de maaltijd, éénmaal daags Voordeel: geen gewichtstoename, weinig risico op hypoglycemie Nadeel: soms lichte misselijkheid

Klasse	Generische naam	Merknaam	Aandachtspunten
DPP-4-remmers (gliptines) (vervolg)	Saxagliptine	Onglyza®	Tablet in te nemen bij of los van de maaltijd, éénmaal daags Voordeel: geen gewichtstoename, weinig risico op hypoglycemie Nadeel: soms lichte misselijkheid
	Sitagliptine	Januvia®	Tablet in te nemen bij of los van de maaltijd, éénmaal daags Voordeel: geen gewichtstoename, weinig risico op hypoglycemie Nadeel: soms lichte misselijkheid
	Vildagliptine	Galvus®	Tablet in te nemen bij of los van de maaltijd Voordeel: geen gewichtstoename, weinig risico op hypoglycemie Nadeel: soms lichte misselijkheid
SGLT-2-remmers (gliflozines)	Canagliflozine	Invokana®	Tablet in te nemen éénmaal per dag Voordeel: geen hypoglycemie, zekere gewichtsafname, positief effect op de bloeddruk Nadeel: hoger risico op infecties van urinewegen en genitaliën, niet geschikt voor personen met nierinsufficiëntie
Incretinomimetica (GLP-1-agonisten)	Exenatide	Byetta®	Toe te dienen via injectie in 2 dagelijkse dosissen binnen het uur vóór het ontbijt en vóór de avondmaaltijd Bijwerkingen: braken, misselijkheid, diarree Voordeel: doorgaans gewichtsafname, weinig risico op hypoglycemie Nadeel: enkel via injectie

Klasse	Generische naam	Merknaam	Aandachtspunten
Incretinomimetica (GLP-1-agonisten) (vervolg)	Exenatide	Bydureon®	Toe te dienen via injectie in 1 wekelijkse dosis, onafhankelijk van de maaltijd, op hetzelfde tijdstip Bijwerkingen: braken, misselijkheid, diarree Voordeel: doorgaans gewichtsafname, weinig risico op hypoglycemie Nadeel: enkel via injectie
	Liraglutide	Victoza®	Toe te dienen via injectie in 1 dagelijkse dosis, onafhankelijk van de maaltijd, op hetzelfde tijdstip Bijwerkingen: braken, misselijkheid, diarree Voordeel: doorgaans gewichtsafname, weinig risico op hypoglycemie Nadeel: enkel via injectie
	Lixisenatide	Lyxumia®	Toe te dienen via injectie in 1 dagelijkse dosis binnen het uur vóór het ontbijt of vóór de avondmaaltijd Bijwerkingen: braken, misselijkheid, diarree Voordeel: doorgaans gewichtsafname, weinig risico op hypoglycemie Nadeel: enkel via injectie
Combinatietabletten	Metformine + Vildagliptine	Eucreas®	Zie hierboven voor de 2 afzonderlijke geneesmiddelen
	Metformine + Sitagliptine	Janumet®	Zie hierboven voor de 2 afzonderlijke geneesmiddelen
	Metformine + Linagliptine	Jentadueto®	Zie hierboven voor de 2 afzonderlijke geneesmiddelen
	Metformine + Saxagliptine	Komboglyze®	Zie hierboven voor de 2 afzonderlijke geneesmiddelen

Tip: Alle patiëntenbijsluiters van de geneesmiddelen op de Belgische markt zijn online beschikbaar op de website van het FAGG: www.fagg-afmps.be.